

Felderítési időszak:  
IV. IX.

## Szelídgesztenye-gubacsdarázs *Dryocosmus kuriphilus*

TÜNET  
ismertető **2.**

Az Európai Unióban szükséghelyzeti határozat révén vizsgálatköteles rovar egyetlen gazdanövénye a szelídgesztenye.  
Már jelen van Olaszországban, Szlovéniában, Horvátországban erdős területeken is. Magyarországra kétszer már bekerült ültetési anyaggal – akkor sikerült megakadályozni megtelepedését. Megjelenése természetes terjedés útján igen valószínű.



### Károsítás tünetei:



A fiatal hajtásokon, a levélnyélen, illetve a levelek főerén található, 8-15 mm átmérőjű zöld vagy pirosas színű gubacsban több lárva fejlődik.  
A darazsak kirepülése után a száraz, fásodó gubacs 1-2 évig az ágakon marad.



Erdős területeken egyetlen védekezési lehetőség a természetes ellenségek (pl. fürkészdarazsak) alkalmazása lehet. A lárva elpusztításával a gubacs növekedése megáll, ezáltal megszűnik a fa további károsodása.

### és okozója:



A darázs a nyár végén rakja tojásait a rügyekbe, amelyekből a következő év tavaszán alakulnak ki a gubacsok. A kifejlett egyedek június elején rajzanak ki belőlük.